


Strongid-P[®]

Waarom ontwormen?

Bij vrijwel alle paarden komen in het maagdarmkanaal rondwormen voor (spoelwormen, grote strongyliden, kleine strongyliden, aarsmaden). Deze wormen kunnen heel wat schade berokkenen wanneer niet tijdig een ontwormingsprogramma wordt ingesteld.




Spoelwormen




1

Grote strongyliden



2

Aantasting darm
door kleine
strongyliden



3

Eieren
van aarsmaden
onder de staart



4

Strongid[®]-P

Waarom Strongid[®]-P gebruiken?

Breed spectrum

Strongid[®]-P is een zeer werkzaam middel tegen **alle belangrijke rondwormen** welke in het maagdarmkanaal kunnen voorkomen:

SPOELWORMEN	<i>Parascaris equorum</i>
GROTE STRONGYLIDEN	<i>Strongylus vulgaris</i>
	<i>Strongylus edentatus</i>
	<i>Strongylus equinus</i>
	<i>Triodontophorus spp.</i>
KLEINE STRONGYLIDEN	<i>Cyathostomum spp.</i>
AARSMADEN	<i>Oxyuris equi</i>

Zeer grote veiligheid

Strongid[®]-P is een uiterst veilig product dat **zonder enig bezwaar gebruikt kan worden bij drachtige merries.**

Strongid®-P

Hoe Strongid®-P te gebruiken?

Om rondwormen efficiënt te bestrijden dient men tijdens het weideseizoen regelmatig te ontwormen.

Paarden en pony's

Alle dieren voordat ze naar buiten gaan met Strongid®-P ontwormen.
Tijdens de weideperiode om de 6 weken ontwormen.

Veulens

Zorg ervoor dat de veulens geboren worden in een omgeving vrij van spoelwormen. Dit kan bereikt worden door de box van te voren goed te reinigen en de merrie te ontwormen voordat ze in de box komt. Nadat de veulens naar buiten gaan, **tegelijktijd met de merries om de 6 weken met Strongid®-P behandelen.**

Bij toepassing van een ontwormingsschema dient men:

- **alle paarden die op hetzelfde perceel grazen tegelijk te behandelen;**
- indien de bestrijding van horzellarven nodig is: de paarden na de eerste vorst te behandelen met een geschikt middel.



Strongid®-P

óók werkzaam tegen lintworm

Naast rondwormen bestaat er ook een kans dat men bij paarden lintwormen aantreft.

Hoe frequent komen lintwormen bij paarden voor?

Onderzoekingen naar het voorkomen van lintwormen bij paarden leverden infectiepercentages op van 13.6% (Canada) tot 81.5% (Nieuw-Zeeland). In een onderzoek in Nederland vond Dr. F.H.M. Borgsteede⁽²⁾ dat 21% van de paarden met lintwormen besmet waren.

Wat is de schade die door lintwormen berokkend wordt?

Lintwormen hechten zich aan de wand van de blindedarm vast, en veroorzaken aldus letsels op de darmwand. Hierdoor kan de dikke darm instulpen en kunnen er klachten ontstaan. Ziekteverschijnselen die kunnen worden waargenomen zijn **verteringsstoornissen**, **diarree** en **koliek**.



Hoe lintworminfecties te behandelen met Strongid®-P?

Door uw paard te behandelen tegen lintwormen voorkomt u beschadigingen van de dikke darm. Strongid®-P is óók geregistreerd voor de bestrijding van lintwormen. Voor een effectieve behandeling van lintworminfecties moet een dubbele dosering Strongid®-P worden toegediend.

Strongid®-P

Een ideale keuze voor regelmatig ontwormen

- Breed spectrum
- Zonder bezwaar te gebruiken bij drachtige merries
- Is óók effectief tegen lintworm
- Instelbare spuit voor veulens en pony's

Ontwormingsschema

Om wormen efficiënt te bestrijden is het aanbevolen Strongid®-P als volgt toe te passen:

- voor het naar buiten gaan
- om de 6 weken tijdens de weideperiode



Voor volledige informatie zie bijsluiter tekst

REFERENTIES

(1) Boersema, J.H., Paardenwormen resistent tegen wormmiddelen, Veehouder en Dierenarts (6), juli 1992

(2) Borgsteede, F.H.M.; van Beek, G., Data on the prevalence of tapeworm infestations in horses in the Netherlands, Vet. Quart. 1996; 18: 110-2
Data on file

Strongid-P®, samenstelling: 1 injector a 22 ml pasta bevat 11,4g pyrantelpamoaat: reg nr 8355, vrij, doeldier: paard, indicaties: worminfecties bij paarden veroorzaakt door Strongylus vulgaris, Str. edentatus en Str. equinus, Trichonema spp., Triodontophorus spp., Oxyuris equi, Parascaris equorum en P. viviparum, wachttijd advies: vlees: 28 dagen, toediening en dosering: 19 mg pyrantelpamoaat per kg l.g., als eenmalige toediening bij besmetting met maagdammenematoden, 38mg pyrantelpamoaat per kg l.g., als eenmalige toediening bij lintworminfecties met Anoplocephala perfoliata. Bij een dosering van 19 mg pyrantelpamoaat per kg l.g. is 1 spuit voldoende voor de behandeling van een paard van 600 kg. Bij een dosering van 38 mg pyrantelpamoaat per kg l.g. zijn 2 spuiten nodig voor de behandeling van een paard van 600 kg., waarschuwingen: in verband met sensibilisatie en contact: dermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. zie verder aanwijzingen op de bijsluiter. Verdere informatie is op aanvraag beschikbaar bij Pfizer Animal Health.



Animal Health

Pfizer Animal Health bv

Postbus 37 • 2900 AA Capelle a/d IJssel

© 2002 Pfizer Animal Health bv - Capelle a/d IJssel

© Merksnaam Pfizer Inc., N.Y., U.S.A

Strongid[®]-P

Een ideale keuze
voor regelmatig ontwormen



Werkt óók tegen lintworm



Animal Health
Visie op gezondheid